



Ziektebeleid van 't Hofje



Kinderen zijn regelmatig ziek, zeker de kleintjes. Dat hoort er nu eenmaal bij. Ook jouw kind zal ongetwijfeld wel eens worden besmet. Als je kind ziek wordt, is dit natuurlijk niet leuk: niet voor je kind en niet voor jullie. Bovendien kan het je soms erg slecht uitkomen. Bedenk echter dat kinderziekten volkomen normaal en zelfs noodzakelijk zijn, omdat je kind daardoor weerstand opbouwt. Houd er rekening mee dat op een kinderdagverblijf regelmatig besmettelijke (kinder)ziekten heersen.

Als er een besmettelijke ziekte heerst bij 't Hofje, hoor je dat uiteraard van ons. Mocht er zo'n ziekte heersen, dan lees je dit al bij of vlak na de voordeur. Zodoende kunnen bijvoorbeeld zwangeren op tijd inschatten wanneer zij beter buiten kunnen blijven.

Wordt je kind ziek tijdens het verblijf bij ons? Dan bellen wij je. We bellen in elk geval als we vinden dat je kind thuis beter af is dan bij ons en gaan er vanuit dat alle ouders ons oordeel daarin naar waarde schatten. Bij ziekte volgen wij in grote lijnen de richtlijnen van de GGD, maar waar we het nodig achten of nodig is gebleken, hanteren we tegelijk ook ons eigen beleid hierover.

Is je kind ziek voordat je het bij ons wilt komen brengen? Dan kun je in het overzicht dat we hiervoor hebben gemaakt nagaan of je kind te ziek is of niet-voldoende-fit om naar 't Hofje te gaan. In dit overzicht op de volgende pagina staan ziekte-verschijnselen die je kunt nalopen. Elk ziekteverschijnsel hebben we een 'score' gegeven. Kijk welke verschijnselen je ziet of hebt ervaren bij je kind en tel de 'scores' daarvan op.

Is de totaalscore 10 of meer, dan is het voor je kind beter om thuis te zijn en hoort het niet op 't Hofje.

Wij gebruiken hetzelfde overzicht om te bepalen of een kind bij ons kan blijven of niet.

Op het overzicht staan alleen ziekteverschijnselen, die bij een kind voor kunnen komen, *zonder* specifieke ziektes te benoemen.

Heeft je kind 'n bepaalde ziekte, dan kun je verderop lezen of een ziek kind dan wel of niet naar 't Hofje mag komen. Soms mag dat namelijk niet, om de andere kinderen en de medewerkers te beschermen. We weren kinderen dan bij het brengen of laten hen ophalen.



Als we andere zorgen hebben bij de gezondheid of het welbevinden van je kind of als we opvallende dingen zien, nemen we sowieso ook contact met je op, om



Ziektebeleid van 't Hofje

Heeft je kind vlekjes of uitslag?

Kijk dan bij de beschrijving van de ziektes wat wijsheid is.

Kijk bij andere signalen in het overzicht hieronder wat je bij je kind ziet en tel de 'scores' op

10 heeft in de afgelopen 6 uur 3 keer waterdunne ontlasting gehad

10 heeft bloederige diaree

10 drinkt niet

10 heeft 39 graden koorts of hoger

10 heeft een koortsstuip of in de afgelopen 8 uur gehad

10 heeft 2 keer of vaker overgegeven

10 heeft een loopoor, dat ik niet wil of kan afplakken

10 heeft hoofdluis, die niet behandeld is (zie toelichting)

10 heeft krentenbaard, die niet behandeld is (zie toelichting)

10 heeft terugkerende krentenbaard

8 is niet alert

7 heeft tussen 38 en 39 graden koorts

7 speelt niet en gewoonlijk wel

7 wil liefst alleen op schoot, wat anders niet zo is

7 wil alleen maar bij mij/ons zijn, wat anders niet zo is

5 eet niet

5 heeft 1 keer overgegeven

4 heeft verhoging tot 38 graden in de afgelopen 6 uur

4 heeft krentenbaard, die 48 uur behandeld is (zie toelichting)

3 heeft minder aandacht voor de omgeving dan gewoonlijk

3 wil graag liggen of hangen

3 heeft in de afgelopen 6 uur 3 keer dunne ontlasting gehad

3 drinkt slecht

3 is huilerig

3 is hangerig

3 klaagt over pijn of lijkt pijn te hebben

3 slaapt veel (veel meer dan anders)

3 slaapt niet of slecht en slaapt gewoonlijk wel goed

3 speelt minder dan gewoonlijk

1 eet slecht

1 hoest

1 heeft een snotneus

1 heeft een loopoor, dat is afgeplakt

'TOTAAL-SCORE'

10 of hoger ---> houd je kind thuis en laat het uitzieken

---> [wij gaan bellen om je kind op te laten halen](#)

7 t/m 9 ---> overweeg wat het beste is voor je kind en overleg eventueel met de leiding van de groep

---> [wij gaan bellen om te overleggen wat het beste is voor je kind](#)

0 t/m 6 ---> er is geen echte reden om je kind niet te brengen

---> [je kind kan gerust op 't Hofje blijven](#)

Voor al deze ziektes geldt dat we informatie hierover geven vanaf thuisarts.nl.

Hier is goede en betrouwbare informatie te vinden over de ziekte zelf, de oorzaak en de behandeling.

Bof

Wat is het?

Bof wordt veroorzaakt door het bofvirus. Het virus verspreidt zich via speekseldruppeltjes in de lucht en via handen, bestek, bekens en speelgoed. Bof is zeer besmettelijk vanaf twee dagen vóódat de wang opzwellt tot vijf dagen daarna. Als je kind de BMR-prik(ken) heeft gehad, is de kans klein dat je kind ziek wordt van het bofvirus.



Verloop

Bof begint vaak met koorts en een opgezette wang door een ontstoken speekselklier. Eten, kauwen, slikken en de mond wijd openen doen dan pijn. Na één tot twee weken is je kind meestal weer beter. Een op de drie kinderen die besmet raakt, krijgt helemaal geen ziekte-verschijnselen. Bof gaat dan ongemerkt voorbij. Er zijn geen medicijnen tegen de bof.

Naar 't Hofje?

Kinderen met de bof mogen naar 't Hofje worden gebracht.

Diarree

Wat is het?

Diarree is dunne waterige ontlasting die veel vaker komt dan gewoonlijk. Het ontstaat vaak door een virus.

Verloop

Je kind kan de volgende klachten hebben bij de diarree: overgeven, koorts en pijnlijke buikkrampen, waarbij de diarree eruit spuit en je kind plotseling moet huilen. Diarree gaat meestal binnen een paar dagen vanzelf over.

Als je kind niet voldoende drinkt, kan het uitdrogen. Je hoeft je geen zorgen te maken over uitdroging als je kind goed drinkt, regelmatig plast (natte luiers heeft), kwijlt of met dikke tranen huult, of als het gewoon rondloopt. Ga bij tekenen van uitdroging of ernstig ziek zijn (niet of weinig plassen of donkere urine, steeds dorst en sufheid) direct naar de huisarts of huisartsenpost.

Naar 't Hofje?

Een kind kan *niet* op 't Hofje komen als het in de afgelopen 6 uur 3 keer waterdunne ontlasting heeft gehad of als het het bloederige diarree heeft. Dat geldt in elk geval tot bekend is waardoor de diarree veroorzaakt wordt. Als broertjes en zusjes ook klachten hebben, moeten zij ook thuisblijven.



Hoofdluis

Wat is het?

Hoofdluizen zijn witachtige insecten van 2 tot 4 mm.


Ze kruipen over de hoofdhuid en de haarwortels. Ze kunnen niet springen.

Luizen voeden zich met bloed. De wondjes die de luizen maken en hun speeksel geven jeuk. Overigens niet bij iedereen. Ze leggen eitjes (neten) die aan het haar vast zitten. Hoofdluizen worden o.a. doorgegeven als hoofden elkaar raken. Daarom komen ze vooral bij kinderen voor.

Naar 't Hofje?

Kinderen met hoofdluis mogen alleen op 't Hofje komen als de behandeling is begonnen. Als we bij kinderen luizen zien, moeten ze worden opgehaald om thuis de behandeling te starten. Omdat het risico bij 't Hofje erg groot is dat luizen worden doorgegeven en 'het niet meer ophoudt', vragen we om de luizen rigoureuus te behandelen, ondanks dat dit niet door alle deskundigen wordt geadviseerd.

Laat zeker op groep weten dat je kind luizen heeft (gehad), ook als je kind thuisblijft en je het behandelt. Hierdoor kunnen andere ouders hun kind ook op luizen controleren en zo nodig behandelen. De kans dat je kind opnieuw luizen krijgt, is dan kleiner.



Kinkhoest

Wat is het?

Kinkhoest is een bacteriële ziekte van de keel, neus en luchtwegen. Deze wordt overgedragen door niezen of hoesten.

Kinderen jonger dan een jaar moeten zo mogelijk uit de buurt van iemand met kinkhoest worden gehouden, omdat ze nog niet of nog niet volledig zijn ingeënt tegen kinkhoest.

Vrouwen die zwanger zijn kunnen zich opnieuw tegen kinkhoest laten vaccineren. Dan is de pasgeborene tegen kinkhoest beschermd, al vóór dat het zelf hiertegen is ingeënt. Ben je meer **dan 34 weken zwanger** en niet tijdens de zwangerschap opnieuw ingeënt, blijf dan uit de buurt van mensen met kinkhoest. Als je tijdens de geboorte kinkhoest hebt, kan je het namelijk overdragen op je baby.

Verloop

Kinkhoest begint met een verkoudheid, niezen, lichte koorts en prikkelhoest.

Na twee weken ontstaan hevige, plotseling opkomende hoestbuien met opgeven van slijm, soms met overgeven en/of blauw aanlopen en daarna vaak een lange gierende inademing. Baby's kunnen van kinkhoest hangerig en lusteloos worden, soms worden ze benauwd en blauw, zonder dat ze hoesten. Na enkele weken worden de hoestbuien minder heftig. Alles bij elkaar kan het hoesten soms wel drie tot vier maanden duren.

Naar 't Hofje?

Een kind met kinkhoest dat zich verder goed voelt, kan gewoon bij 't Hofje komen.

Het is belangrijk dat we weten dat je kind kinkhoest heeft (gehad). Dan kunnen we andere ouders over de ziekte informeren zodat zij eventuele kinkhoest bij hun kind herkennen.



Koorts

Wat is het?

Koorts is een normale reactie van het lichaam op een infectie met virussen of bacteriën. De hoogte van de koorts zegt op zich weinig over de ernst van de ziekte. Zodra het lichaam de ziekte de baas is, daalt de temperatuur weer.

Naar 't Hofje?

Bij het ene kind merk je niets als het koorts heeft en is het verder in zijn of haar humeur en soms is dat precies andersom. Ondanks dat hanteren we de lichaamstemperatuur van een kind *wel* als maatstaf bij de beslissing of een kind wel of niet op 't Hofje kan zijn.

Bij verhoging tot 38 graden beslist de groepsleiding, in overleg met elkaar, of een kind wel of niet moet worden opgehaald, afhankelijk hoe je kind zich voelt en gedraagt.

Bij koorts tussen 38 en 39 graden bekijken ze dat extra kritisch.

En bij 39 graden koorts of meer, bellen we om je kind op te komen (of laten) ophalen.



Krentenbaard

Wat is het?

Krentenbaard is een besmettelijke bacteriële infectie van de huid. Deze bacterie wordt meestal overgebracht via handen of voorwerpen zoals speelgoed. Soms ook via hoesten of niezen. Krentenbaard is besmettelijk tot de wondjes zijn ingedroogd of genezen. Als er veel wondjes, blaasjes en gele korstjes rond de neus en mond zitten, kan het eruitzien als een baard van krenten, vandaar de naam.

Verloop

Krentenbaard komt het meest voor bij kinderen onder de 12 jaar. De infectie zit meestal rond de neus of mond, maar kan op het hele lichaam voorkomen. Op de plaats van de infectie zijn op de huid wondjes te zien en/of rode plekkjes of blaasjes met gele korstjes, die soms jeuken. Soms zijn er zwellingen in het gezicht en de hals te voelen, door opzwellende klieren. Als een opengebarsten blaasje indroogt, ontstaat een honinggele of geelbruine korst. Met een antibioticumcrème geneest de huid sneller.

Naar 't Hofje?

Kinderen met onbehandelde krentenbaard mogen niet naar 't Hofje komen, tenzij de blaasjes zijn ingedroogd. Als de huisarts antibiotica voorschrijft moet deze 48 uur gegeven worden met zichtbaar resultaat, voordat je kind weer bij 't Hofje kan komen.



Overgeven

Naar 't Hofje?

Als een kind op 't Hofje 2 keer of vaker overgeeft gaan we je bellen. Als dat thuis gebeurt kan je je kind beter thuis houden, afhankelijk van hoe je kind zich voelt.

Bij één keer kun je nog denken dat er iets dwars zat, bij de tweede keer is er ongetwijfeld iets anders aan de hand. Geeft je kind op 't Hofje 2 keer of vaker over, dan beslist de groepsleiding, in overleg met elkaar en afhankelijk hoe je kind zich voelt, of je kind moet worden opgehaald.



Pseudokroep

Wat is het?

Pseudokroep is een virusontsteking van de bovenste luchtwegen. Het geeft zwelling van de binnenkant van het strottenhoofd, bij de stembanden. Meestal is het onschuldig.

Verloop

Een eerste aanval van pseudokroep is voor ouders vaak spannend om mee te maken.

Bij pseudokroep is je kind niet ziek, soms alleen verkouden. Toch wordt je kind

's avonds of 's nachts huilend en benauwd wakker met een blafhoest en is soms hees.

Bij het inademen hoor je een gierend geluid. Een aanval van pseudokroep gaat binnen enkele uren vanzelf over.

Naar 't Hofje?

Kinderen met Pseudocroup mogen naar 't Hofje komen



Ringworm

Wat is het?

Ringworm is een huidschimmel. Huidschimmels groeien in de huid, de nagels of de haren van mensen of dieren. Soms geeft de huid minder goede bescherming. Dan kan een schimmelinfectie ontstaan. Dit geeft rode plekken met schilfers en meestal jeuk.

Verloop

Op de huid ontstaan rode plekken met schilfering langs de randen. Soms zijn het ringvormige plekken die steeds groter worden, terwijl het midden ervan alweer geneest.

Deze vorm van huidschimmel wordt 'ringworm' genoemd. De plekken kunnen jeuk en een branderig gevoel geven. Ook kunnen er kleine blaasjes en puistjes ontstaan.

Naar 't Hofje?

Kinderen met ringworm mogen naar 't Hofje komen.



Rodehond

Wat is het?

Rodehond is een besmettelijke vlekjesziekte door een virus, die wordt overgedragen bij hoesten en praten en via handen, bestek, speelgoed, deurknoppen, e.d.

Verloop

Rodehond is besmettelijk vanaf 10 dagen vóór tot 7 dagen na het verschijnen van de vlekjes. Na besmetting duurt het 2 tot 3 weken voordat je het merkt. Het begint vaak met een verkoudheid, waarbij de klieren achter de oren en in de hals opgezet kunnen zijn en de temperatuur soms iets verhoogd. Na een dag ontstaan rozerode vlekjes in het gezicht en achter de oren, die zich binnen een paar uur over het hele lichaam verspreiden. Dat verdwijnt na enkele dagen. De klieren kunnen soms nog enkele weken gezwollen blijven.

Bij de helft van de kinderen met rodehond merk je overigens helemaal niets.

Naar 't Hofje?

Kinderen met rodehond mogen naar 't Hofje komen.

Meld de besmetting a.u.b. op de groep, zodat andere ouders gewaarschuwd kunnen worden over een mogelijke besmetting. **Er is zowel een risico voor andere kinderen als voor (de baby van) zwangere vrouwen.**



Roodvonk

Wat is het?

Roodvonk wordt veroorzaakt door een bacterie (streptokok), die ook keelpijn of wondroos veroorzaakt. De bacterie kan bij hoesten, niezen of praten via druppeltjes in de lucht van de een naar de ander gaan. Roodvonk komt het meeste voor bij kinderen tussen 3 en 8 jaar.



Verloop

Roodvonk begint met verlies van eetlust, keelpijn, koorts die snel hoger wordt (soms tot 40 graden) en pijnlijke klieren in de hals. Bij roodvonk kan een kind ook overgeven en buikpijn hebben. De tong verkleurt, deze wordt eerst wit en na 3 dagen rood, dik en bobbelig (*frambozentong*). Op de 2e dag dat een kind ziek is, komt er een rode uitslag op de borst (rode puntjes op een rode achtergrond) die ruw aanvoelt en niet jeukt. De uitslag verspreidt zich over het hele lichaam, vooral naar de oksels en de liezen. De huid rond de mond blijft bleek. De koorts daalt binnen 3 tot 5 dagen. De uitslag verdwijnt enkele dagen later.

Na 2 tot 3 weken kan de huid vervellen, vooral aan de handen en voeten.

Naar 't Hofje?

Kinderen met roodvonk mogen naar 't Hofje komen.

Bij uitzondering mag een kind met roodvonk pas komen na de start van de behandeling.

Als dat zo is, kondigen we dat in de hal aan.

Spruw

Wat is het?

Spruw is een infectie van het mondslijmvlies door een gist (*Candida albicans*). Het komt bij ongeveer 4% van de baby's voor, meestal jonger dan 6 weken.



Verloop

Witte plekjes in de mond van de baby kunnen wijzen op spruw.

De plekjes zitten meestal tegen de wangen, op de tong en het gehemelte en kunnen moeilijk worden weggeveegd. Soms kunnen er ook wel wat blaasjes in de mond zitten. Baby's met spruw hebben soms opvallend glanzende lippen. Meestal heeft een baby met spruw nergens last van, maar soms drinkt een kind onrustig en laat vaak de tepel of speen los. Spruw gaat vaak vanzelf weer over. Alleen als een kind met spruw niet goed drinkt, de tepel of speen steeds loslaat of veel huilt, moet het met een medicijn worden behandeld. De Candida die de spruw veroorzaakt kan ook op de billen van een baby zitten en daar rode uitslag veroorzaken.

Naar 't hofje?

Kinderen met spruw mogen naar 't Hofje komen.

Vijfde ziekte

Wat is het?

De vijfde ziekte is een kinderziekte, veroorzaakt door een virus.

Het virus wordt bij hoesten en praten via druppeltjes in de lucht overgedragen. De 5^e ziekte komt vooral voor bij kinderen van 4 tot 10 jaar.



Verloop

Na de besmetting duurt het ongeveer twee weken voordat een kind rode wangen met grillige, roze-rode vlekjes krijgt. Zodra de vlekjes zichtbaar worden is een kind niet meer besmettelijk. De uitslag breidt zich uit naar de romp, billen, armen en benen. De vlekjes vloeien samen tot grotere vlekken. Een kind met de vijfde ziekte kan koorts en jeuk hebben, maar voelt zich verder meestal niet ziek. Na ongeveer tien dagen is de uitslag verdwenen. Bij warmte, kou of inspanning kunnen de vlekjes tijdelijk terugkomen. Er zijn geen medicijnen tegen de vijfde ziekte.

Naar 't Hofje?

Kinderen met de vijfde ziekte mogen naar 't Hofje komen.

Waterpokken

Wat is het?

Waterpokken is een kinderziekte, die bijna elk kind een keer krijgt. Het wordt door een virus veroorzaakt, dat bij hoesten en praten via druppeltjes in de lucht wordt overgedragen en door contact met het vocht uit de blaasjes. De ziekte is heel besmettelijk, vanaf één dag voordat de verschijnselen zichtbaar worden totdat de blaasjes zijn ingedroogd.



Verloop

Na besmetting duurt het maximaal drie weken voordat je iets merkt. Eerst wordt een kind verkouden, daarna ontstaan over het hele lichaam vlekjes en blaasjes, vaak ook in de mond, in het haar en op de oogleden. Je kind kan wat hongerig zijn, maar is meestal niet erg ziek. De uitslag jeukt en kan gepaard gaan met lichte koorts. De blaasjes verdrogen tot korstjes, die na tien dagen zijn verdwenen.

Risico's

Ben je zwanger en heb je zelf waterpokken gehad of ben je ingeënt, dan heeft contact met iemand met waterpokken geen gevolgen voor jou of je ongeboren kind. Anders loop je risico om ook waterpokken te krijgen. Waterpokken kan bij zwangeren ernstig verlopen. De kans op een ernstige longontsteking door waterpokken is bijvoorbeeld groter. Waterpokken kunnen gevaarlijk zijn voor pasgeborenen als je de ziekte doormaakt in de dagen rond de geboorte.

Tips, hulpmiddelen, e.d.

Er zijn geen medicijnen om waterpokken sneller te laten genezen. Door krabben wordt de jeuk erger en kunnen infecties en littekens ontstaan. Houd daarom de nagels van je kind schoon en kort en zorg dat je kind zich niet krabt. Je kunt een koelende vloeistof, zoals een zinkoxide-lotion of een koelende gel (carbomeerwatergel) op de vlekjes doen. Daardoor vermindert de jeuk en drogen de blaasjes sneller in. Dit koop je bij de drogist of apotheek, zonder recept. Je hebt ook middelen voor onder de douche of in bad, die helpen. Je kind mag (dus) gewoon in bad of onder de douche. Daarna kun je je kind beter niet droog wrijven, maar deppen, zodat de blaasjes niet (onnodig) open gaan. Bij pijnlijke blaasjes in de mond kan een waterijsje of koude drank de pijn tijdelijk verzachten.

Naar 't Hofje?

Volgens de richtlijnen van de GGD en het RIVM mogen kinderen met waterpokken bij de kinderopvang komen. Wij adviseren daarnaast dringend om je kind thuis te houden als deze er ziek van is. Realiseer je tegelijkertijd dat het risico op ontstekingen en andere besmettelijkheden binnen een groep kinderen groter is dan thuis. En dat is zeker zo als de blaasjes open zijn. Als je dat risico niet wilt nemen, is 't Hofje niet de beste plaats voor je kind.

Zesde ziekte

Wat is het?

De zesde ziekte is een ziekte met hoge koorts en lichtrode vlekjes. De oorzaak is een herpesvirus (type 6). Waarschijnlijk wordt het virus bij hoesten en praten via druppeltjes in de lucht overgedragen. De zesde ziekte komt het meest voor bij kinderen tussen de 6 maanden en 2,5 jaar.



Verloop

Bij de zesde ziekte heeft je kind plotseling hoge koorts (39° C tot 40,5° C). Soms zijn de klieren in de hals en achter de oren opgezet. Na 3 tot 5 dagen daalt de koorts weer snel. Er komen dan kleine lichtrode vlekjes in het gezicht en de nek en later ook op de romp. De vlekjes jeuken niet. De uitslag verdwijnt binnen 1 tot 2 dagen. Is je kind met koorts jonger dan 3 maanden? Bel dan direct de huisarts.

Naar 't Hofje?

Kinderen met de zesde ziekte mogen naar 't Hofje komen.

Ziekte van Pfeiffer

Wat is het?

De ziekte van Pfeiffer wordt veroorzaakt door een virus. Het virus zit in het speeksel. Het is niet precies bekend hoe het virus wordt overgedragen. Omdat het virus misschien ook door zoenen wordt overgebracht, wordt het ook wel 'kissing disease' genoemd.

Bijna iedereen krijgt dit virus, meestal zonder klachten. Pfeiffer komt het meeste voor bij jongeren tot ongeveer 25 jaar. Kinderen jonger dan 10 krijgen het virus ook vaak, maar op die leeftijd geeft de infectie (bijna) geen verschijnselen.



Verloop

Nadat je het virus gekregen hebt, duurt het 4 dagen tot 7 weken voordat de eerste ziekteverschijnselen beginnen. Mogelijke klachten zijn: keelpijn, koorts en dikke, gevoelige halsklieren. Ook op andere plekken van je lichaam kunnen de klieren vergroot zijn. Op de keelamandelen zit vaak een wit vlekkelig of grijs slijmerig laagje. Als je keelpijn hebt, duurt die vaak langer dan een week. Op het gehemelte kunnen kleine bloeduitstortinkjes zichtbaar zijn. Bij sommigen is de lever gevoelig, tijdelijk vergroot en werkt tijdelijk minder goed. Soms kan iemand met Pfeiffer daardoor geelzucht krijgen. Dit gaat meestal vanzelf over. Andere mogelijke klachten zijn hoofdpijn, misselijkheid, zweten en hoesten. Pfeiffer gaat vanzelf over, meestal binnen een paar weken. Soms duurt de ziekte langer dan een paar weken. Dan is moeheid het meest opvallende verschijnsel. Je kunt het beste zo veel mogelijk doorgaan met je dagelijkse activiteiten (school, werk, sport). Extra rusten of slapen helpt niet.

Naar 't Hofje?

Kinderen met de ziekte van Pfeiffer mogen naar 't Hofje komen.

Wat we doen met:

Antibiotica

Als je kind antibiotica krijgt, moet deze de tijd krijgen om aan te slaan. Daarvoor rekenen we 48 uur.

Daarna kun je je kind gerust brengen.

Als er dan nog antibiotica gegeven moet worden, geef deze dan in de originele verpakking mee, dan nemen we deze zorg van je over in de tijd dat je kind op 't Hofje is.



Paracetamol

Wij vinden het zorgelijk dat kinderen worden gebracht terwijl ze thuis al paracetamol hebben gekregen. Als dit gebeurt willen we daar zeker van op de hoogte zijn en weten wat de reden hiervoor is. Paracetamol zorgt er namelijk voor dat koorts of pijn tijdelijk verdwijnt, maar het neemt niet de oorzaak weg. Het onderdrukt een duidelijk en belangrijk alarmsignaal van het lichaam.

Mocht je toch paracetamol geven, weet dan dat de koorts of pijn weer terug zal komen als de paracetamol is uitgewerkt en we alsnog zullen vragen om je kind op te komen halen.

Als je kind gedurende de dag ziek wordt, geven we geen paracetamol, zodat het op 't Hofje kan blijven.

We bieden alleen paracetamol aan op doktersvoorschrift en om het voor je kind zo comfortabel mogelijk te maken, in de tijd die je nodig hebt om je kind te komen ophalen.

